


コロナワクチンのお話

コロナに負けるな! がんばれ大阪! がんばれ日本!



新型コロナワクチンは「筋肉注射」。

肩の筋肉に、垂直に接種します。一般的に筋肉注射は皮下注射より痛くないとされています。腫れや赤みも出にくく、免疫は付きやすいです。



1回目で副反応が出てても2回目接種は可能。

アナフィラキシーなど重い症状でなければ、2回目接種は可能です。必ずしも次も同じ症状が出るわけではありません。また、副反応予防のためにあらかじめ解熱剤など服用することは推奨されていません。



ワクチンの副反応って?



新型コロナワクチン(ファイザー社)接種後の副反応の出現頻度

副反応はワクチン接種が原因で起こる反応のことです。頻度は日本人が特に多いということはありません。1回目より2回目接種後により強く起こりやすいですが、十分な免疫をつけるには2回接種が望ましいとされています。また、このワクチンを接種しても人の遺伝子に影響が出ることはありません。

いつ出る? 接種した1~2日後に副反応が出現することがありますが、ほとんどは3日以内に回復します。特に2回目接種後は発熱を含めた副反応が起きやすいので、接種当日と翌日は、可能なら予定を空けておくことをおすすめします。

どんな症状? 主に接種部位の痛み・だるさ・頭痛・筋肉痛・発熱などがあり、発熱以外に悪寒や関節痛が出る場合も。接種直後の痛みはそれほど強くありません。発熱時は解熱剤を使っても構いません(ワクチンの効果は下がりにません)。解熱剤はアセトアミノフェンを含むものをおすすめ。

主な副反応

- 接種時の痛み
- だるさ
- 頭痛
- 筋肉痛
- 寒気
- 発熱
- 接種部位の腫れ
- 関節痛
- 吐き気

副反応が出ててもよくある症状なら様子を見て落ち着いた中継行を

体調が回復しない場合は?

咳やのどの痛み、息切れなどの症状が見られたら上気道炎(風邪)や新型コロナウイルス感染症等の可能性も。(これがワクチンの副反応で通常見られないため)

こんな時は医療機関に相談

- ☑ 接種後2日以上経っても解熱しない
- ☑ 症状が重い

接種券が自宅に配達されますので、その書類にしたがってください。自分で堺市のサイトにアクセスの上集団予防接種を受けることも可能です。当院でも、希望者のアンケートを開始しております。ワクチン入荷に合わせて接種していく予定です。『高齢者』⇒『基礎疾患のある方』⇒『一般』の順です。

いずれにしても早く打てるプランを探しましょう! かかりつけの方で、『パソコン、スマホの操作が苦手』だったり、ご高齢の方、『登録競争はムリ』といった方に関しましてはご相談ください。

コロナ検査(抗原、PCR、抗体検査)もひきつづき承ります。

訪問診療・訪問看護・健康診断も適宜承ります

医療法人泉翔会 かとう鳳クリニック ☎ 072-272-8811